

Hati- Hati Gonore Penyakit Menular Seksual Si Penyebab Kencing Nanah

klinikkelainku.com/gonore-penyakit-menular-seksual

10/25/202110/25/2021



gambar penyakit kelamin gonore kencing nanah

Gonore, penyakit menular seksual yang sangat menular adalah infeksi bakteri yang disebabkan oleh mikroba *Neisseria gonorrhoeae* yang ditularkan melalui kontak seksual. **Gonore** sering ditandai dengan keluarnya cairan kental dari penis atau vagina. Namun, banyak orang tidak memiliki tanda atau gejala apapun. Penyakit ini ditularkan melalui air mani atau cairan vagina selama hubungan seks tanpa kondom, homoseksual atau heteroseksual atau dengan pasangan yang terinfeksi. Semakin banyak pasangan seks yang Anda miliki, semakin tinggi risiko Anda.

Berlawanan dengan kepercayaan populer, Anda tidak bisa mendapatkan **gonore** dari duduk toilet atau dari gagang pintu. Bakteri penyebab kencing nanah membutuhkan kondisi pertumbuhan dan reproduksi yang sangat spesifik. Ia tidak dapat hidup di luar tubuh lebih dari beberapa detik atau menit, ia tidak dapat hidup di kulit tangan, lengan atau kaki. Ini bertahan hanya pada permukaan lembab di dalam tubuh dan paling sering ditemukan di vagina dan leher rahim. Gonore dapat hidup di uretra (saluran yang mengalirkan urin dari kandung kemih).

Gonore bisa ada di bagian belakang tenggorokan Anda (dari kontak oral-genital) dan rektum. Juga, seorang wanita hamil yang terinfeksi **gonore** dapat memberikan **gonore** kepada anaknya saat melahirkan. Kontak teratur seperti berciuman tidak menularkan penyakit. Ketika ada infeksi pada kelamin, mulut atau dubur seorang anak paling sering

disebabkan bahwa ia telah mengalami pelecehan seksual. Pengobatan kencing nanah melibatkan antibiotik untuk menghilangkan infeksi. Mempraktekkan seks aman penting dalam mencegah gonore (Kencing Nanah).

Gejala Gonore

Sekitar setengah dari mereka yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala. Orang yang tidak menunjukkan gejala mungkin secara tidak sadar menularkan infeksi gonore kepada pasangannya.

Tenggorokan, anus, uretra, dan rektum adalah area infeksi yang umum pada pria dan wanita. Jika bergejala, kemungkin termasuk buang air kecil yang menyakitkan, gatal dubur, pendarahan atau keluarnya cairan abnormal dari penis atau vagina.

Wanita dengan gonore mungkin tidak memiliki gejala atau memiliki gejala yang sangat ringan sehingga tidak diperhatikan sampai menjadi lebih parah. Dalam beberapa kasus, wanita akan merasakan sensasi terbakar saat buang air kecil; akan muncul keputihan berwarna kuning kehijauan atau pendarahan saat berhubungan. Wanita juga mungkin mengalami pendarahan vagina di antara periode menstruasi. Keterlibatan uretra menyebabkan disuria (nyeri buang air kecil), sekresi purulen dan frekuensi kencing (kental). Kombinasi uretritis dan servitis pada pemeriksaan sangat relevan dalam diagnosis karena kedua tempat tersebut terinfeksi pada sebagian besar pasien.

Jika infeksi menjadi lebih luas dan masuk ke dalam rahim atau saluran tuba, dapat menyebabkan sakit perut, demam dan nyeri saat berhubungan seksual dan gejala seperti di atas. (Ini disebut infeksi tambahan atau SIP radang panggul).

Pria yang memiliki **kencing nanah** lebih mungkin untuk melihat gejala meskipun mereka mungkin memiliki gonore tanpa menyadarinya. Mereka sering merasakan sensasi terbakar saat buang air kecil dan mungkin mengeluarkan cairan kuning keputihan dari penis.

Apa yang terjadi jika saya tidak mengobati kencing nanah?

Kencing nanah bisa sangat berbahaya jika tidak diobati bahkan pada seseorang yang memiliki gejala ringan atau tanpa gejala sama sekali. Pada wanita, infeksi dapat masuk ke dalam rahim, di saluran tuba dan ovarium (menyebabkan sindrom radang panggul) dan dapat menyebabkan kerusakan dan kemandulan (infertilitas, ketidakmampuan untuk memiliki anak). Kerusakan tuba menyebabkan peningkatan risiko kehamilan ektopik karena sel telur yang dibuahi mungkin tidak dapat melewati tuba falopi dan luka menyempit.

Kehamilan ektopik adalah masalah yang sangat serius yang dapat mengancam kehidupan seorang wanita. Infeksi kencing nanah selama kehamilan dapat menyebabkan masalah bagi bayi baru lahir, termasuk meningitis (radang selaput di sekitar otak dan sumsum tulang belakang) dan infeksi mata yang dapat menyebabkan kebutaan jika tidak diobati. Pada wanita, Bartolini dan abses terjadi (menyebabkan kesulitan berjalan),

sindrom radang panggul. Pada pria, penyakit ini dapat mencapai epididimis (struktur yang melekat pada testis yang membantu mengangkut sperma) daerah yang menyebabkan rasa sakit dan peradangan pada testis. Hal ini bisa mengakibatkan luka yang bisa membuat pria mandul (mandul).

Pada kedua jenis kelamin, kencing nanah dapat terjadi akibat hubungan seks anal dengan orang yang terinfeksi atau dari penyebaran infeksi dari area genital. Hal ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan di daerah anus dan kebocoran di daerah ini tetapi dalam banyak kasus tidak ada tanda atau gejala yang muncul.

Pengobatan Gonore

Jika Anda berpikir Anda mungkin menderita gonore atau jika Anda memiliki pasangan, yang mungkin menderita gonore, pergilah ke dokter keluarga atau ginekolog. Dia akan memeriksa Anda, yang akan mencakup pengambilan sampel dari vagina atau cairan penis untuk diberikan analisis. Terkadang dokter dapat mendiagnosis gonore dengan analisis urin seseorang. Tanyakan kepada dokter Anda tes apa yang sesuai untuk Anda. Dokter dapat melakukan tes gonore dan tes lain untuk PMS lain seperti sifilis atau Chlamydia.

Jika Anda didiagnosis menderita kencing nanah, dokter akan meresepkan antibiotik untuk mengobati infeksi. Semua orang yang pernah melakukan hubungan seksual harus segera dites dan diobati untuk penyakit gonore. Ini termasuk setiap pasangan seksual dalam dua bulan terakhir atau pasangan seksual terakhir jika sudah lebih dari dua bulan setelah kontak seksual terakhir.

Jika pasangan seksual menderita gonore, pengobatan & penanganan secara cepat akan mengurangi risiko komplikasi bagi orang tersebut dan akan mengurangi kemungkinan infeksi ulang jika Anda berhubungan seks dengan pasangan itu lagi. (Anda bahkan dapat menginfeksi kembali gonore bahkan setelah Anda dirawat, karena fakta bahwa Anda menderita gonore tidak akan membuat Anda kebal).

Di masa lalu, pengobatan gonore tanpa komplikasi cukup sederhana. Satu suntikan penisilin menyembuhkan hampir semua orang yang terinfeksi. Sayangnya, ada jenis baru yang menjadi resisten terhadap berbagai antibiotik termasuk penisilin dan karena itu lebih sulit diobati. Untungnya, gonore dapat diobati dengan obat atau suntikan oral lainnya.

Incoming search terms:

Tag: gonore, kencing nanah, Neisseria gonorrhoeae, penyakit menular seksual

Seringkali gonore/kencing nanah tidak memiliki gejala atau sedikit gejala. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka telah terinfeksi oleh penyakit ini terutama wanita. Dan mereka telah terinfeksi gonore tanpa menyadarinya. Sekitar

Dalam beberapa tahun terakhir, penyakit menular seksual telah meningkat jumlahnya dan akan terus meningkat kecuali tindakan pencegahan diambil untuk mengendalikan mekanisme yang memungkinkan penyebaran penyakit ini di antara penduduk.

Gonore ditularkan melalui kontak seksual dengan penis, vagina, mulut atau anus. Ejakulasi tidak wajib untuk transmisi gonore atau gonore yang akan didapat. Risiko terinfeksi gonore berbanding lurus dengan jumlah